

FALLSTUDIE

Behandlung einer Verbrennung zweiten Grades mit Flaminal®

Knapen Marijn, Wundpflegekraft, häusliche Krankenpflege
Tongeren- Borgloon- Kortesseem, Belgien

Behandlung einer Verbrennung zweiten Grades



PATIENT

- Männlich
- 55 Jahre



HINTERGRUND

- Typ 2 Diabetes
- Verbrennung zweiten Grades durch das versehentliche Treten in einen Topf mit kochendem Wasser
- Aversion gegenüber Krankenhäusern
- Regelmäßige Laborkontrollen weisen einen niedrigen Kaliumspiegel und hohe Entzündungswerte auf
- Antibiotika und Kalium wurden verabreicht



Behandlung einer Verbrennung zweiten Grades

Tag 1



Behandlung

- Lose Haut wurde entfernt.
- Reinigung mit Flamirins®.
- Primärverband: **Flaminal® Forte** wurde auf den gesamten Fuß appliziert.
- Sekundärverband: Jelonet und Melolin plus Fixierung mit Binde.
- Verbandswechsel 2x pro Tag.

Wundgröße: Gesamter linker Fuß

Aufgrund seiner diabetischen Erkrankung hatte der Patient Angst, seine Zehen zu verlieren.



Behandlung einer Verbrennung zweiten Grades mit Flaminal®



Beginn der Behandlung
mit **Flaminal® Forte**



Monat 4



Monat 5



Monat 5: Wunde fast verheilt

5 Monate

Flaminal®
Absorbierendes Alginol

